



DEUTSCHLANDS
APFELSORTEN.

ILLUSTRIRTE, SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG
DER IM GEBIETE DES
DEUTSCHEN POMOLOGEN-VEREINS
GEBAUETEN APFELSORTEN.

HERAUSGEGEBEN
IM
AUFTRAGE UND UNTER MITWIRKUNG
DES
DEUTSCHEN POMOLOGEN-VEREINS
VON
DESSEN ERSTEM VORSTANDE


DR. TH. ENGELBRECHT,

Geh. Med. - Rath und Professor in Braunschweig.

HOLZSCHNITTE NACH ZEICHNUNGEN DES VERFASSERS ANGEFERTIGT VON
ALBERT PROBST.

BRAUNSCHWEIG,
DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN.

1889.



179. Englischer Erdbeerapfel (Ill. H.) 0††, Novbr. bis Januar.
Diel, system. Verz. Nr. 529. — Ill. Hdb. I, p. 429. — Winter Strawberry (Downing)?

Gestalt 61:50 — 51, auch grösser (70:55 — 56, Illustr. Handb.), abgest.
rundlich, wenig stielbauch. Häuten gleich.

Kelch geschlossen, grün, wollig. Blättchen breit, am Grunde sich berüh-
rend, ziemlich lang, nach innen geneigt, aufrecht. Einsenk. mitteltief,
mittelweit, zwischen sehr merklichen, doch flach über die Frucht lau-
fenden Rippen. Querschn. nicht ganz rund.

Stiel meistens holzig und ziemlich dünn, etwa 11 mm lang, meist braun,
dicht behaart. Höhle tief, mittelweit, schwachfaltig, braun berostet.

Schale etwas geschmeidig, mattglänzend, gelblichgrün, später grünlichgelb,
sonnenw. punktirt geröthet, oft weithin matt carmoisinroth, lang ge-
streift. Punkte ziemlich zahlreich, fein, hell umflossen. Geruch sehr
merklich.

Kernhaus 36:27, zwiebelf. Kammern 9:16, stielw. spitz, kelchw. abge-
rundet, wenig zerrissen, geräumig, meistens etwas offen. Achsenh.
mittelbreit. Kerne zu 1 bis 2, gross, vollkommen, länglich eiförmig,
gespitzt, etwas hellkastanienbraun.

Kelchhöhle kegelf. $\frac{3}{5}$ zur Achsenh. Pistille kurz bis mittellang ver-
wachsen, vom Grunde bis zur Theilung dicht, fast filzig behaart. Staub-
fäden im äussern Drittel.

Fleisch hellgrüngelblich bis gelblichweiss, fein, erst fest, später markig
bis mürbe, saftig, rosenapfelartig gewürzt, etwas vorherrschend weinig,
ziemlich süss.

Die Früchte erhielt ich von Goethe-Geisenheim, Lippold-Dresden.